

Substudie Hypogonadismus bei älteren Männern mit und ohne HIV-Infektion und Typ 2-Diabetikern im Rahmen der Studie 50/2010 (HYPE)

Es sollen Fragen zur Versorgungsforschung des Hypogonadismus (Testosteron-Mangel-Syndrom) gestellt werden. Studiendaten insbesondere zur Situation HIV-positiver Männer liegen in Deutschland nicht vor.

Ein wichtiger Hinweis: Unsere Arbeitshypothese lautet, dass nur wenige Patienten hinsichtlich eines Hypogonadismus umfassend untersucht werden. Es wäre also nicht ungewöhnlich, wenn dies auch in Ihrem Zentrum zutreffen würde. Versorgungsforschung kann nur gut und valide sein, wenn die Fragen so zutreffend wie nur möglich beantwortet werden. Wir werden Ihre Angaben absolut vertraulich behandeln. Bitte helfen Sie uns, valide Daten zu erheben. Vielen Dank!

- Haben Sie Ihren Patienten **früher** klinisch hinsichtlich eines möglichen Hypogonadismus untersucht?
Falls ja, bitte jüngstes Datum angeben: __.__._____
- Haben Sie bei Ihrem Patienten jemals **früher** eine Testosteronbestimmung durchgeführt?
Falls ja, bitte jüngstes Datum angeben: __.__._____
- Falls ja, welchen Wert/welche Werte haben Sie bestimmt? Bitte ankreuzen:
 - Gesamt-Testosteron
 - SHBG (Sexualhormon-bindendes Globulin)
 - Albumin
 - Freies Testosteron
- Haben Sie **früher** schon einen Fragebogen verwendet, mit welchem haben Sie gearbeitet (bitte ankreuzen)?
 - ADAM-Fragebogen
 - AMS-Fragebogen
 - Smiths´ Scale
 - mit einem anderen Fragebogen (bitte angeben: _____)
 - mit keinem Fragebogen